

Psykiskt status, exempel vid vanföreställningssyndrom

Områden som bör/kan beröras. Ställs inte upp med rubriker utan beskrivs i löpande text.	<i>Exempel och förslag, kommentarer</i>	
Kort beskrivning av patientens yttre/ somatiska observationer:	<p>"Värdad/särpräglad klädsel", <i>Tecken på yttre trauma:</i> Rivmärken på halsen, skärsår på handlederna, etc. <i>Abstinenssymptom:</i> Tremor, svettning, etc. <i>Missbrukstecken:</i> Stickmärken, miotiska pupiller, etc. <i>Annat:</i> Foetor ex ore, ikterisk, gula sklerae, kakektisk, etc.</p>	
Vakenhetsgrad/medvetandegrad:	Helt vaken, slö, sömnig, i dvala men väckbar, medvetandesänkt men reagerar på smärtstimuli, medvetslös, etc.	
Orienteringsgrad, v b Intellektuella funktioner:	<p>"Helt orienterad (tid, rum och person), orienterad till tid och rum men ej till person". "När- och fjärrminne u.a." Konfabulationer? (<i>tecken på avsaknad av närminne, ses vid Wernicke-Korsakoffs syndrom</i>). Närminne testas med femsaksprov. Vid misstanke om demens utförs Mini-mental test.</p>	
Kontaktförstående, formell och emotionell:	<p>Formell kontakt gäller grovt att tala begripligt och upprätthålla samtalet. Emotionell kontakt gäller känslomässig tillgänglighet/närvaro, fölsamhet.</p> <p>God formell och emotionell kontakt, god formell men bristfällig emotionell kontakt, reserverad/avvisande i kontakten, självförsunken, ej kontaktbar pga ..., etc.</p>	
Grundstämning/affekter:	<p>Förhöjd/neutral/sänkt. Ex "neutral till lätt sänkt grundstämning." Euforisk, expansiv, irritabel. Oro, irritation, aggressivitet, gråter/skrattar, affektlabil.</p> <p><i>Typiska schizofrena tecken:</i> Inadekvata affekter, avtrubbade (flacka) affekter - ett "negativt" symptom</p> <p><i>Typiska maniska tecken:</i> Förhöjd grundstämning. Expansiv, irritabel, euforisk.</p>	
: Motorik, mimik och talets motorik och fonetik	<p>Anges vid avvikelse, annars ex "Psykomotorik ua"</p> <p><i>Motorik:</i> Motoriskt orolig, rastlös, ofrivilliga rörelser, hämmad motorik, etc.</p> <p><i>Mimik:</i> Sparsam/livlig mimik, etc.</p> <p><i>Tal:</i> Flödande/ordikt tal, talträngd, enstaviga svar, stackato tal, lång svarslatens, mutism, talar med hög röst, entonigt, etc.</p> <p><i>Typiska depressiva tecken:</i> Sparsam mimik, lång svarslatens - tecken på "psykomotorisk hämning"</p> <p><i>Typiska maniska tecken:</i> Flödande/ordikt tal, talträngd, talar med hög röst.</p> <p><i>Typiska schizofrena tecken:</i> Mutism, stackatotal, mumlar för sig själv.</p>	
Tankeförlopp:	<p>Koncentrationssvårigheter, ambivalens, tankehämning, förvirring (bör beskrivas), ordsallad (uppkommer vid splittring), perseveration (svårt att avbryta en tankegång), etc.</p> <p><i>Typiska maniska tecken:</i> Tankeflykt, ytliga associationer.</p> <p><i>Typiska schizofrena tecken:</i> Depersonalisation, derealisation, tankedetraktion, tanketrängsel, tankestopp, ordsallad, ytliga associationer, neologismer, förbisvar, perseveration.</p>	
Tankeinnehåll:	<p>Tvångstankar, vanföreställningar (kan vara primära eller sekundära, och bisarra eller icke-bisarra), övervärdiga idéer (grandiositet eller megalomi) depersonalisation, derealisation, depressivt tankeinnehåll.</p> <p><i>Typiska schizofrena tecken:</i> Tankeutsändning, tankepåsättning, tankeöverföring, tankestyrning, tankepåverkan, tanke- och handlingspåverkan. (Detta är patientens tolkningar av sin jag-störning.)</p> <p><i>Typiska maniska tecken:</i> Grandiositet, megalomi.</p>	
Perceptionsstörningar:	Illusioner, hallucinationer (hörsel/röst-, syn-, lukt- eller somatiska/kroppsliga hallucinationer).	
Suicidal intention:	Ev dödstankar, dödsönskan, suicidtankar, suicidplaner, suicidförsök.	
Sjukdomsinsikt/-känsla, behandlingsmotivation:	Vanligtvis obefintlig vid vanföreställningssyndrom.	